

Missbruk av gas hos Faluns unga och unga vuxna

Vi i Faluns BRÅ (brottsförebyggande råd) vill uppmärksamma er på att vi just nu får mycket information om att Faluns unga och unga vuxna missbrukar gas som egentligen säljs för andra syften. Mer information om skador mm finns på nästa sida. Den mest vanliga formen av gas som missbrukas nu är lustgas som främst säljs som patroner till gräddsifoner, se bilder nedan.



Butangas är också en gas som säljs för andra syften är missbruk, men som just nu också förekommer bland Faluns unga och unga vuxna. Butangas finns t ex i gas som används till tändare samt i olika andra sprayflaskor som t ex doftsprayer, se bilder nedan.



Information om missbruk av gas som nedan kallas boffning/sniffning

Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning/boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller överdos.

Sniffning/boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning/boffning väldigt farligt. Sniffning/boffning innebär att man drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar är ruset kraftigt.

Påverkan på kroppen

Gaserna man andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan kan man drabbas av hallucinationer. Syrebristen påverkar inte bara hjärnan. Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i kroppen. Hjärtat hamnar under hård press och man kan få rubbningar i hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.

En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning/sniffning kombineras med alkohol eller andra droger ökar också risken för överdos eller medvetslöshet. Ett långvarigt missbruk kan ge hjärnskador, skador på lever, njurar och andra organ.

Symptom på att någon sniffat/boffat är minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrättattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet. Huvudvärk sömnproblem, frossa och kramper kan vara tecken på abstinens.

KÄLLOR:

CAN/DRUGSMART

Giftinformationscentralen

Vårdguiden 1177.se

Bilder är lånade från internet

Sprid gärna den här informationen till andra handlare och andra företag som ni tänker har nytta av informationen. Hör av er om ni undrar över något eller uppmärksammar något som ni tänker att vi i Faluns BRÅ behöver informeras om.

Med vänlig hälsning

Faluns BRÅ/

Ulrika Gustafsson Lindberg

BRÅ-samordnare, Falu kommun

ulrika.gustafsson-lindberg@falun.se